
PAS > 160 mmHg
PAS > 180 mmHg ou PAM > 140 mmHg
PAS < 180 mmHg et PAM < 140 mmHg
Traitement d'attaque :
Nicardipine IV : bolus de 0,5 à 1 mg
et
Perfusion continue de 4 à 7 mg en 20 minutes
Traitement d'entretien :
Nicardipine IV en perfusion continue : 1 à 6 mg/h
Ou
Labétalol IV en perfusion continue : 5 à 20 mg/h
Évaluation efficacité / tolérance après 30 minutes
PAS < 140 mmHg
et
PAM < 100 mmHg
160 mmHg > PAS >140 mmHg
et
120 mmHg > PAM >100 mmHg
PAS > 160 mmHg
ou
PAM > 120 mmHg
Effets secondaires
(céphalées, palpitations)
Diminuer
Ou
arrêter
le traitement
Traitement d'entretien
Nicardipine IV : 1 à 6 mg/h
Nicardipine IV : 6 mg/h
+
Labétalol 5 à 20 mg/h
Ou (Si β-bloquant contre-indiqué)
Réduire Nicardipine IV
+
Labétalol 5 à 20 mg/h
Ou (Si β-bloquant contre-indiqué)
Réévaluation après 30 minutes puis par heure